SUR UNE NOUVELLE COCHENILLE CÉCIDOGÈNE

PAR

Paul MARCHAL

Aspidiotus (*Hemiberlesia*) *nitrariæ* nov. sp.

♀. — Bouclier circulaire, blanc, assez transparent, avec dépouille larvaire jaune ; 0,5 à 0,6^{mm}. Pas de glandes circumgénitales. Palettes médianes fortes à 3 divisions, la médiane saillante ; palettes de la deuxième paire triangulaires, à côté interne parallèle à l'axe médian de l'animal et à côté externe oblique se prolongeant insensiblement avec le contour du corps ; palette de la troisième paire conformée d'une façon analogue à la deuxième, mais plus petite et plus obtuse ; soies assez longues et dépassant fortement les palettes ; peignes petits et assez peu distincts, ceux placés entre les deux palettes médianes et ceux interposés entre la palette médiane et la première latérale étant notablement plus courts que les palettes entre lesquelles ils sont placés ; ceux qui sont entre la première palette latérale et la deuxième étant les plus apparents et montrant quelques dentelures. Pas de paraphyses distinctes. Un faisceau de glandes tubulaires étroites et longues de chaque côté du pygidium.

J'ai récolté l'année dernière, à la fin d'avril, cette Cochenille à Médenine (sud de la Tunisie), sur les feuilles des *Nitraria* ; elle détermine à la place où elle est fixée une petite dépression circulaire, qui se traduit de l'autre côté de la feuille par une saillie pustuliforme.